

50

ΜΙΓΜΑ ΠΑΧΥΝΣΗΣ ΚΟΥΝΕΛΙΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η τροφή **No 50** χορηγείται κατά βούληση σε **κουνέλια πάχυνσης** από τη 55^η - 60^η ημέρα της ζωής τους έως και 2 ημέρες πριν τη σφαγή. **Περιέχει κοκκιδιοστατικό**. Για τις ανάγκες των 2 τελευταίων ημερών, χορηγείστε το μίγμα **No 50X** (πάχυνσης κουνελιών άνευ κοκκιδιοστατικού).

No 52		No 53		No 50	
0 ημ.	θηλασμός	30 ημ.	απογαλακτισμός	60 ημ.	πάχυνση
					90 ημ.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Μηδικάλευρο, κριθάρι, πίτουρα, ηλιάλευρο, πούλπα ζαχαροτεύτλων, μελάσα ζαχαροτεύτλων, ανθρακικό ασβέστιο, φωσφορικό μονοασβέστιο, χλωριούχο νάτριο.

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ %

ΟΛ. ΑΖΩΤΟΥΧΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	16,00	ΟΛ. ΤΕΦΡΑ	9,00
ΟΛ. ΛΙΠΑΡΕΣ ΟΥΣΙΕΣ	3,40	ΑΣΒΕΣΤΙΟ (Ca)	1,25
ΟΛ. ΙΝΩΔΕΙΣ ΟΥΣΙΕΣ	16,50	ΦΩΣΦΟΡΟΣ (P)	0,60
ΥΓΡΑΣΙΑ	12,00	ΝΑΤΡΙΟ (Na)	0,24

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΛΕΣ ΑΝΑ Kg

Βιταμίνη Α (Ρετινόλη, 3a672a)	8.800	I.U.	Mn	ΜΑΓΓΑΝΙΟ : (Mn(II)Oxide, 3b502)	68	mg
Βιταμίνη D ₃ (Χολοκαλσιφερόλη, 3a671)	800	I.U.	Zn	ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ : (ZnOxide, 3b603)	80	mg
Βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη, 3a700)	80	mg	Fe	ΣΙΔΗΡΟΣ : (Fe(II)Sulphate, 3b103)	60	mg
Βιταμίνη Κ ₃ (Μεναδιόνη, 3a711)	2,0	mg	Cu	ΧΑΛΚΟΣ : (CuSO ₄ .5H ₂ O, 3b405)	8	mg
Βιταμίνη Β ₁ (Θειαμίνη, 3a821)	1,6	mg	I	ΙΩΔΙΟ : (Ca-Iodate, 3b203)	1,5	mg
Βιταμίνη Β ₂ (ΡΙβοφλαβίνη)	4		Se	ΣΕΛΗΝΙΟ : Na-Selenite (3b802)	0,2	mg
Βιταμίνη Β ₆ (Πυριδοξίνη, 3a831)	2,4	mg				
Βιταμίνη Β ₁₂ (Κυανοκοβαλαμίνη)	12	mcg				
ΝΙΑΣΙΝΗ (Νικοτινικό οξύ, 3a314)	33,4	mg				
ΠΑΝΤΟΘΕΝΙΚΟ ΟΞΥ (3a841)	16	mg		Κοκκιδιοστατικό: Diclazuril (51775)	1	mg
ΦΟΛΙΚΟ ΟΞΥ (3a316)	4	mg				
ΒΙΟΤΙΝΗ (3a880)	400	mcg				
ΧΟΛΙΝΗ (3a890)	400	mg				

ΜΟΡΦΗ : Κύβος (pellets)

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ : 25, 40 Kg

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με τα πρότυπα **ISO 9001** και **ISO 22000** (HACCP) πιστοποιημένο από την TÜV HELLAS. Κωδικός Έγκρισης ΕΕ : **αEL6100001**.

Για περισσότερες πληροφορίες να απευθύνεστε στους Γεωτεχνικούς της Εταιρείας στο τηλέφωνο επικοινωνίας **23510-25222**.

240425